

Tentamen i TATA24 Linjär Algebra

2019-01-16 kl 14.00–19.00

Inga hjälpmedel. Ej räknedosa.

På del A och B (uppgift 1–6) ska endast svar ges. De ska lämnas på ett gemensamt papper. Varje uppgift på del A och B ger högst 1 poäng.

Uppgifterna på del C (uppgift 7–10) ger högst 3 poäng per uppgift, och till dessa krävs fullständiga och välmotiverade lösningar.

För betyg 3/4/5 krävs minst 2 poäng på del A, minst 2 poäng på del B, minst 2/3/4 uppgifter på del C som bedömts med minst 2 poäng vardera, samt minst 8/12/16 poäng totalt.

Godkänd kontrollskrivning ger 3 poäng på del A (uppgift 1–3) som då inte behöver lösas. Markera detta genom att skriva "G" i rutorna för uppgift 1–3.

Svar finns efter skrivningstidens slut på kursens hemsida.

Nedan ges \mathbb{R}^n alltid standardskalärprodukten, och standardbasen i \mathbb{R}^n ses som ett höger ON-system när lämpligt.

DEL A

1. Bestäm minstakvadratlösningen till ekvationssystemet
$$\begin{cases} x_1 & = 1 \\ x_1 + 2x_2 & = 2. \\ & x_2 = 2 \end{cases}$$

2. Beräkna inversen till matrisen
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ -3 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

3. Ange en ekvation på normalform för det plan i \mathbb{R}^3 som innehåller punkten $(2, 1, 3)$ och linjen $(1 + 2t, -1, t)$, $t \in \mathbb{R}$.

DEL B

4. Den linjära avbildningen $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ har avbildningsmatris $\begin{pmatrix} 8 & 1 \\ -4 & 4 \end{pmatrix}$ i standardbasen. Bestäm alla F 's egenvärden och motsvarande egenrum.

5. Beräkna determinanten av matrisen
$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

6. Avbildningen $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ är linjär och avbildar $(1, 2)$ på $(1, 2, 3)$ och $(0, 1)$ på $(-1, 1, 0)$. Ange F 's avbildningsmatris i standardbaserna för \mathbb{R}^2 och \mathbb{R}^3 .

VÄND!

DEL C

7. Låt \mathbb{V} vara det linjära höljet $[(1, 0, 2, 1), (1, 1, -3, -1), (-3, -1, 5, -1)]$ i \mathbb{R}^4 . Bestäm en ON-bas för \mathbb{V} och en ON-bas för \mathbb{V}^\perp .

8. Lös systemet av differensekvationer $\begin{cases} a_n = 5a_{n-1} + 2b_{n-1} \\ b_n = -4a_{n-1} - b_{n-1} \end{cases}$ med begynnelsevärdena $a_0 = 1$ och $b_0 = 2$.

9. Bestäm de punkter som ligger närmast origo på den ellipsoid i \mathbb{R}^3 som ges av

$$4x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3 = 8.$$

10. Låt \mathbb{V} vara ett vektorrum och låt $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m \in \mathbb{V}$.

(a) Vad är definitionen av att vektorerna $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m$ är linjärt oberoende? (1p)

(b) Visa att om \mathbb{V} är ett euklidiskt rum och vektorerna $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m$ är nollskilda och parvis ortogonala så är $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m$ linjärt oberoende. (2p)

LYCKA TILL!

TATA24, TENTAMEN 2019-01-16
SVAR OCH KORTFATTADE LÖSNINGSSKISSER

1. Normalekvationen är

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}$$

som har den enda lösningen $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = 1$.

Svar: $(x_1, x_2) = (\frac{1}{2}, 1)$.

2. Elementära radoperationer ger $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

Svar: $\begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ 4 & -1 & 1 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

3. **Svar:** $2x_1 + 5x_2 - 4x_3 = -3$.

4. **Svar:** Det enda egenvärdet är 6, med egenrum $[(1, -2)]$.

5. **Svar:** -2.

6. Basvektorernas bilder är $F((1, 0)) = F((1, 2)) - 2F((0, 1)) = (1, 2, 3) - 2(-1, 1, 0) = (3, 0, 3)$
och $F((0, 1)) = (-1, 1, 0)$.

Svar: $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$.

7. Vi skapar en ortogonal bas för \mathbb{V} med Gram-Schmidt; normering ger sedan en ON-bas:

$$\mathbf{b}_1 = (1, 0, 2, 1)$$

$$\mathbf{b}_2 = (1, 1, -3, -1) - (1, 1, -3, -1)_{\|\mathbf{b}_1} = (1, 1, -3, -1) + (1, 0, 2, 1) = (2, 1, -1, 0)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{b}_3 &= (-3, -1, 5, -1) - (-3, -1, 5, -1)_{\|\mathbf{b}_1} - (-3, -1, 5, -1)_{\|\mathbf{b}_2} \\ &= (-3, -1, 5, -1) - (1, 0, 2, 1) + 2(2, 1, -1, 0) = (0, 1, 1, -2). \end{aligned}$$

Nu kan \mathbb{V}^\perp beskrivas som lösningsrummet till (exempelvis) ekvationssystemet

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ x_2 + x_3 - 2x_4 = 0. \end{cases}$$

Dess lösningar är $(x_1, x_2, x_3, x_4) = t(-1, 2, 0, 1)$, $t \in \mathbb{R}$.

Svar: $\left(\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 0, 2, 1) \quad \frac{1}{\sqrt{6}}(2, 1, -1, 0) \quad \frac{1}{\sqrt{6}}(0, 1, 1, -2)\right)$ respektive $\left(\frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 2, 0, 1)\right)$.

8. Koefficientmatrisen A har egenvärdena 1 och 3 med egenrummen $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ respektive $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$. Med denna information kan vi diagonalisera A och få

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -4 & -1 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} a_0 \\ b_0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 3^n \\ -2 & -3^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -3 + 4 \cdot 3^n \\ 6 - 4 \cdot 3^n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Svar: $a_n = -3 + 4 \cdot 3^n$, $b_n = 6 - 4 \cdot 3^n$.

9. Med $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ kan vänsterledet i ellipsoidens ekvation skrivas $Q(\underline{e}X) = X^t A X$, där

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Dess egenvärden är 3 och 6. (De är positiva, så ekvationen beskriver verkligen en ellipsoid.) Eftersom $Q(\mathbf{u}) \leq 6|\mathbf{u}|^2$, så gäller för \mathbf{u} på ellipsoiden att $|\mathbf{u}| \geq \sqrt{8/6} = 2/\sqrt{3}$. Vidare uppnås likhet, det vill säga minsta möjliga $|\mathbf{u}|$, precis då $\mathbf{u} = \underline{e}X$ där X är en egenvektor till A med egenvärde 6.

Egenrummet som hör till 6 spänns upp av $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, så vi söker de $\mathbf{u} = t(1, -1, 1)$ som ligger på ellipsoiden. Det gäller om och endast om $t = \pm \frac{2}{3}$ (sätt in i ellipsoidens ekvation och lös ut t , alternativt använd villkoret att $|\mathbf{u}| = 2/\sqrt{3}$).

Svar: $(x_1, x_2, x_3) = \pm \frac{2}{3}(1, -1, 1)$.

10.

(a) **Svar:** Att $\lambda_1 \mathbf{u}_1 + \lambda_2 \mathbf{u}_2 + \dots + \lambda_m \mathbf{u}_m = \mathbf{0}$ medför $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_m = 0$.

(b) Låt $(\cdot | \cdot)$ beteckna \mathbb{V} 's skalärprodukt. Antag att $\lambda_1 \mathbf{u}_1 + \lambda_2 \mathbf{u}_2 + \dots + \lambda_m \mathbf{u}_m = \mathbf{0}$. Tag $i \in \{1, 2, \dots, m\}$. Det måste visas att $\lambda_i = 0$. Notera att

$$0 = (\mathbf{0} | \mathbf{u}_i) = (\lambda_1 \mathbf{u}_1 + \lambda_2 \mathbf{u}_2 + \dots + \lambda_m \mathbf{u}_m | \mathbf{u}_i) = \lambda_i |\mathbf{u}_i|^2,$$

där sista likheten följer av att \mathbf{u}_i och \mathbf{u}_j är ortogonala om $i \neq j$. Eftersom $\mathbf{u}_i \neq \mathbf{0}$ gäller $|\mathbf{u}_i| > 0$ och därför måste $\lambda_i = 0$, som önskat. \square