

Tentamen i TATA43 Flervariabelanalys

2013-05-31 kl 14–19

Inga hjälpmedel tillåtna (inte heller miniräknare).

8/12/16 poäng med minst 3/4/5 uppgifter med minst 2 poäng (av 3 möjliga) ger betyg 3/4/5. Länk till lösningsskiss finns efter tentamen på kursens hemsida.

Resultatet blir klart inom 10 arbetsdagar. Information om visning ges då på kursens hemsida.

1. Bestäm samtliga lokala maximi- och minimipunkter till

$$f(x, y) = x^3 + 3x^2 + 4xy + y^2.$$

2. Bestäm alla \mathcal{C}^1 -lösningar $z(x, y)$ till differentialekvationen

$$xz'_x - yz'_y = xy$$

för $x > 0$ och $y > 0$ under bivillkoret $z(x, x) = 0$ genom att till exempel göra variabelbytet $u = xy$, $v = y$.

3. Beräkna

$$\iiint_D z \, dx dy dz,$$

där D ges av $0 \leq x + 2y \leq y + z \leq y - 2z \leq 2$.

4. Beräkna

$$\iint_D x^2 e^{-x^2-y^2} \, dx dy,$$

där D är den första kvadranten.

5. Bestäm största och minsta värdet, om de finns, av $xy - z$ då $4x^2 + y^2 + z^2 \leq 16$ och $x \geq 0$.

6. Visa att ekvationen $y^3 + \cos xy = 2$ i en omgivning till punkten $(x, y) = (0, 1)$ entydigt definierar en \mathcal{C}^1 -funktion $y = y(x)$. Avgör sedan om denna funktion har lokalt extremvärde i punkten $x = 0$.

7. Betrakta funktionen $f(x, y) = \begin{cases} y^2 \arctan \frac{x}{y^2}, & y \neq 0, \\ 0, & y = 0. \end{cases}$

Visa att f är differentierbar i origo men ej av klass \mathcal{C}^1 .

Lösningsskisser till tentamen i TATA43 Flervariabelanalys 2013-05-31

1. De stationära punkterna fås ur $f'_x = 3x^2 + 6x + 4y = 0$ och $f'_y = 4x + 2y = 0$. Den andra ekvationen ger genast $y = -2x$, som insatt i den första ger $3x^2 - 2x = 0$, d.v.s. $x = 0$ eller $x = 2/3$, och vi får därmed två stationära punkter: $(0, 0)$ och $(2/3, -4/3)$.

Andraderivatorna blir $f''_{xx} = 6x + 6$, $f''_{xy} = 4$ och $f''_{yy} = 2$.

I $(0, 0)$ blir $f''_{xx} = 6$, och den kvadratiske formen

$$\begin{aligned} Q(h, k) &= \begin{pmatrix} h & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{xy} & f''_{yy} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} \\ &= 6h^2 + 8hk + 2k^2 = 2(k + 2h)^2 - 2h^2, \end{aligned}$$

som är indefinit eftersom t.ex. $Q(0, 1) = 2 > 0$ medan $Q(-1, 2) = -2 < 0$, så punkten $(0, 0)$ är ingen lokal extrempunkt för f .

I $(2/3, -4/3)$ blir $f''_{xx} = 10$, och vi får den kvadratiske formen

$$Q(h, k) = 10h^2 + 8hk + 2k^2 = 2(k + 2h)^2 + 2h^2,$$

som är positivt definit eftersom $Q(h, k) \geq 0$ för alla (h, k) och $Q(h, k) = 0$ endast om $k + 2h = 0$ och $h = 0$, d.v.s. endast om $(h, k) = (0, 0)$. Således är punkten $(2/3, -4/3)$ en lokal minimipunkt för f .

Svar: $(2/3, -4/3)$ är en lokal minimipunkt. Lokala maximipunkter saknas.

2. Kedjeregeln ger $z'_x = z'_u u'_x + z'_v v'_x = yz'_u$ och $z'_y = z'_u u'_y + z'_v v'_y = xz'_u + z'_v$, och insättning i differentialekvationen ger $-yz'_v = xy$ för $x > 0$, $y > 0$, d.v.s. $z'_v = -u/v$ för $u > 0$, $v > 0$, som integrerad ger $z = -u \ln v + g(u) = -xy \ln y + g(xy)$, där g är en \mathcal{C}^1 -funktion av en variabel. Bivillkoret ger nu $0 = z(x, x) = -x^2 \ln x + g(x^2)$ då $x > 0$, så $g(t) = t \ln \sqrt{t} = t(\ln t)/2$ för $t > 0$, och därmed får vi till sist $z(x, y) = -xy \ln y + xy(\ln xy)/2 = xy(\ln(x/y))/2$ då $x > 0$ och $y > 0$.
Svar: $z(x, y) = (xy/2) \cdot \ln(x/y)$.

3. Linjärt variabelbyte:

$$\begin{cases} u = x + 2y, \\ v = y + z, \\ w = y - 2z, \end{cases} \quad \frac{d(u, v, w)}{d(x, y, z)} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -3, \quad dudvdw = |-3| dx dy dz = 3 dx dy dz,$$

ger nytt område $E : 0 \leq u \leq v \leq w \leq 2$, och, med upprepad integration,

$$\begin{aligned} \iiint_D z dx dy dz &= \iiint_E \frac{v-w}{3} \frac{dudvdw}{3} = \frac{1}{9} \int_0^2 \left(\int_0^w \left(\int_0^v (v-w) du \right) dv \right) dw \\ &= \frac{1}{9} \int_0^2 \left(\int_0^w (v^2 - vw) dv \right) dw = \frac{1}{9} \int_0^2 \left(-\frac{w^3}{6} \right) dw = -\frac{2}{27}. \end{aligned}$$

4. Integralen är generaliserad men integranden är positiv, så variabelbyte och upprepad integration får användas. Vi får, först med planpolärt byte och sedan med bytet $t = \rho^2$ i ρ -integralen följt av partiell integration i t -integralen,

$$\begin{aligned} \iint_D x^2 e^{-x^2-y^2} dx dy &= \int_0^\infty \rho^3 e^{-\rho^2} d\rho \cdot \int_0^{\pi/2} \cos^2 \varphi d\varphi \\ &= \left[-\frac{(t+1)e^{-t}}{2} \right]_0^\infty \cdot \left[\frac{\varphi}{2} + \frac{\sin 2\varphi}{4} \right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

5. De två bivillkoren $g(x, y, z) = 4x^2 + y^2 + z^2 \leq 16$ och $h(x, y, z) = x \geq 0$ bestämmer en sluten (fylld) halvellipsoid – alltså en kompakt mängd – och målfunktionen $f(x, y, z) = xy - z$ är kontinuerlig där. Alltså existerar största och minsta värde för f på denna mängd.

Vi får $\nabla f = (y, x, -1)$, $\nabla g = (8x, 2y, 2z)$ och $\nabla h = (1, 0, 0)$. Kandidatjakt:

- Kandidater i kroppen $g < 16$, $h > 0$ finns där $\nabla f = \mathbf{0}$, men $\nabla f \neq \mathbf{0}$ överallt. Inga kandidater här.
- Kandidater på ytan $g = 16$, $h > 0$ finns där $\nabla f \parallel \nabla g$, d.v.s. där $\nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$, vilket är där (a) $xz + y = 0$, (b) $4x + yz = 0$ och (c) $y^2 = 4x^2$. Ekvation (c) ger två delfall: (i) $y = 2x$ respektive (ii) $y = -2x$. Insättning i (a) och (b) ger i fall (i) $x(z + 2) = 0$, alltså $z = -2$ eftersom $h = x > 0$, och insättning i $g = 16$ ger sedan $4x^2 + (2x)^2 + (-2)^2 = 16$, alltså $x = \pm\sqrt{3/2}$, som efter kontroll mot $h > 0$ ger kandidaten $f(\sqrt{3/2}, \sqrt{6}, -2) = 5$; i fall (ii) får vi på likartat sätt $z = 2$ och kandidaten $f(\sqrt{3/2}, -\sqrt{6}, 2) = -5$.
- Kandidater på ytan $h = 0$, $g < 16$ finns där $\nabla f \parallel \nabla h$, d.v.s. där $\nabla f \times \nabla h = \mathbf{0}$, men $\nabla f \times \nabla h = (0, -1, -x) \neq \mathbf{0}$ överallt. Inga kandidater här.
- Kandidater på kurvan $g = 16$, $h = 0$, slutligen, finns där $\{\nabla f, \nabla g, \nabla h\}$ är linjärt beroende, d.v.s. där

$$0 = \begin{vmatrix} y & x & -1 \\ 8x & 2y & 2z \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 2(xz + y),$$

d.v.s. där $y = -xz$. Insättning i $h = 0$ och $g = 16$ ger $x = 0$, $y = 0$ och $z^2 = 16$, och därmed kandidaterna $f(0, 0, 4) = -4$ och $f(0, 0, -4) = 4$.

$$\text{Svar: } f_{\max} = f(\sqrt{3/2}, \sqrt{6}, -2) = 5, f_{\min} = f(\sqrt{3/2}, -\sqrt{6}, 2) = -5.$$

6. Sätt $F(x, y) = y^3 + \cos xy$. Eftersom $F \in C^1$, $F(0, 1) = 2$ och $\nabla F(0, 1) = (0, 3)$, som har y -komponent $\neq 0$, ger implicita funktionssatsen att ekvationen $F(x, y) = 2$ i en omgivning till punkten $(x, y) = (0, 1)$ definierar en C^1 -funktion $y(x)$ med $y(0) = 1$. Vidare, för små $x \neq 0$ gäller det att $xy(x)$ är litet och $\neq 0$ varför $\cos(xy(x)) < 1$ där, och därför får vi att $y(x)^3 = 2 - \cos(xy(x)) > 1$ och därmed att $y(x) > 1 = y(0)$ för små $x \neq 0$; således har $y(x)$ (strängt) lokalt minimum i $x = 0$. Svar: Ja, lokalt minimum.

(Alternativt kan man – när existensen av C^1 -funktionen $y(x)$ är bevisad – derivera implicit och studera teckenväxlingen för derivatan $y'(x) = (y(x) \sin xy(x)) / (3y(x)^2 - x \sin xy(x))$ i en omgivning till $x = 0$, eller motivera att $y(x)$ är en C^2 -funktion och visa att $y'(0) = 0$ och $y''(0) = 1/3 > 0$.)

7. Eftersom $f(x, 0) = 0$ för alla x och $f(0, y) = 0$ för alla y ser vi till att börja med att $f'_x(0, 0) = 0$ och $f'_y(0, 0) = 0$.

När $y \neq 0$ ger vanliga deriveringsregler att $f'_x(x, y) = y^4 / (x^2 + y^4)$, och eftersom t.ex. $f'_x(0, t) = 1 \rightarrow 1 \neq 0 = f'_x(0, 0)$ då $t \rightarrow 0$ ser vi att f'_x inte är kontinuerlig i $(0, 0)$, och därmed är f inte av klass C^1 .

Vidare, eftersom $|\arctan t| < \pi/2$ för alla t får vi $|f(x, y)| \leq y^2 \cdot \pi/2$ (även när $y = 0$), och därmed också $|f(x, y)| \leq (x^2 + y^2) \cdot \pi/2 = \rho^2 \cdot \pi/2$, så

$$\left| \frac{f(h, k) - f(0, 0) - f'_x(0, 0) \cdot h - f'_y(0, 0) \cdot k}{\sqrt{h^2 + k^2}} \right| = \frac{|f(h, k)|}{\sqrt{h^2 + k^2}} \leq \frac{\rho^2 \cdot \pi/2}{\rho} = \rho \cdot \pi/2 \rightarrow 0$$

då $\rho \rightarrow 0$ (och φ varierar fritt), så f är differentierbar i origo.