

**TATA 44 Vektoranalys. TEN 1.****2010-10-23, kl 8.00–12.00**

Varje uppgift kan ge 0, 1, 2 eller 3 poäng. En uppgift räknas som godkänd om den bedömts med minst 2 poäng. För betyget  $n$ ,  $n = 3, 4, 5$ , krävs  $3n - 1$  poäng och  $n$  godkända uppgifter.

Tillåtet hjälpmedel: *Formelbladet i vektoranalys*. Ingen räknedosa tillåten.

Lösningar till tentamen återfinns efter skrivtidens slut på kursens hemsidor.

1. Beräkna arean av den del av konen  $z = 3 - 2\sqrt{x^2 + y^2}$  som ligger innanför paraboloiden  $z = x^2 + y^2$ .

2. Beräkna kurvintegralen  $\int_{\Gamma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}$  där  $\mathbf{A} = -yz \hat{x} + xz \hat{y} + xy \hat{z}$  och  $\Gamma$  är skärningskurvan mellan planet  $x + y + z = 3$  och cylindern  $x^2 + y^2 = 9$ .  $\Gamma$  genomlöps moturs sett från  $(0, 0, 51)$ .

3. Beräkna flödet av vektorfältet  $\mathbf{A} = xy^2 \hat{x} + yz^2 \hat{y} + x^2z \hat{z}$  genom ytan  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ,  $x, y, z \geq 0$  i riktningen som ges genom  $\hat{n} \cdot \hat{z} > 0$ .

4. Bestäm en potential för vektorfältet

$$\mathbf{A} = \frac{(1 - r^2) \cos \phi \sin \theta}{(1 + r^2)^2} \hat{r} + \frac{\cos \phi \cos \theta}{1 + r^2} \hat{\theta} - \frac{\sin \phi}{1 + r^2} \hat{\phi}$$

och beräkna kurvintegralen  $\int_{\Gamma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}$  där  $\Gamma$  är skärningskurvan mellan planet  $x = y$  och ellipsoiden  $x^2 + 4y^2 + 5z^2 = 25$  med  $x, y, z \geq 0$  och  $\Gamma$  genomlöps moturs sett från punkten  $(-1, -2, 0)$ .

5. Beräkna kurvintegralen

$$I = \int_{\Gamma} \frac{x}{(x^2 + 4y^2)^{3/2}} dx + \frac{4y}{(x^2 + 4y^2)^{3/2}} dy$$

där  $\Gamma$  är den del av den räta linjen  $x + y = 1$  med  $x, y \geq 0$  i  $xy$ -planet och  $y : 0 \rightarrow 1$ .

6. Beräkna flödet av vektorfältet

$$\mathbf{A} = \left( \frac{x}{(y^2 + z^2)^{3/2}}, \frac{y}{(y^2 + z^2)^{3/2}}, \frac{z}{(y^2 + z^2)^{3/2}} \right)$$

ut ur ytan  $x = y^2 + z^2$  med  $0 \leq x \leq 1$  så att  $\hat{n} \cdot \hat{x} < 0$ .

**TATA 44 Vector analysis. TEN 1.****2010-10-23, 08.00–12.00**

Each question is marked 0, 1, 2 or 3 points. An answer to a question is deemed to be good if it obtains at least 2 points. In order to obtain grade  $n$ ,  $n = 3, 4, 5$ , on the exam you need  $3n - 1$  points and  $n$  good answers.

You are allowed to use the formula sheet *Formelbladet i vektoranalys*. No calculators are allowed.

The solutions to the examination will be posted on the course homepage after the examination.

1. Calculate the area of that part of the cone  $z = 3 - 2\sqrt{x^2 + y^2}$  which lies within the paraboloid  $z = x^2 + y^2$ .

2. Calculate the line integral  $\int_{\Gamma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}$  where  $\mathbf{A} = -yz \hat{x} + xz \hat{y} + xy \hat{z}$  and  $\Gamma$  is the curve given by the intersection of the plane  $x + y + z = 3$  and the cylinder  $x^2 + y^2 = 9$ .  $\Gamma$  is traversed anticlockwise as seen from  $(0, 0, 51)$ .

3. Calculate the flux of the vector field  $\mathbf{A} = xy^2 \hat{x} + yz^2 \hat{y} + x^2z \hat{z}$  through the surface  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ,  $x, y, z \geq 0$  in the direction defined by  $\hat{n} \cdot \hat{z} > 0$ .

4. Find a potential function for the vector field

$$\mathbf{A} = \frac{(1 - r^2) \cos \phi \sin \theta}{(1 + r^2)^2} \hat{r} + \frac{\cos \phi \cos \theta}{1 + r^2} \hat{\theta} - \frac{\sin \phi}{1 + r^2} \hat{\phi}$$

and calculate the line integral  $\int_{\Gamma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}$  where  $\Gamma$  is given by the intersection of the plane  $x = y$  and the ellipsoid  $x^2 + 4y^2 + 5z^2 = 25$  with  $x, y, z \geq 0$  and  $\Gamma$  is traversed anticlockwise as seen from  $(-1, -2, 0)$ .

5. Calculate the line integral

$$I = \int_{\Gamma} \frac{x}{(x^2 + 4y^2)^{3/2}} dx + \frac{4y}{(x^2 + 4y^2)^{3/2}} dy$$

where  $\Gamma$  is that part of the straight line  $x + y = 1$  with  $x, y \geq 0$  in the  $xy$ -plane and  $y : 0 \rightarrow 1$ .

6. Calculate the flux of the vector field

$$\mathbf{A} = \left( \frac{x}{(y^2 + z^2)^{3/2}}, \frac{y}{(y^2 + z^2)^{3/2}}, \frac{z}{(y^2 + z^2)^{3/2}} \right)$$

out of the surface  $x = y^2 + z^2$  with  $0 \leq x \leq 1$  so that  $\hat{n} \cdot \hat{x} < 0$ .

**TATA44 Lösningar till tentamen 23/10/2010.**

1.) Låt  $S$  beteckna den del av konen  $z = 3 - 2\sqrt{x^2 + y^2}$  som är innanför paraboloiden  $z = x^2 + y^2$ . Konen skär paraboloiden då  $x^2 + y^2 = 3 - 2\sqrt{x^2 + y^2}$  och med  $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$  så har vi  $\rho^2 = 3 - 2\rho$  eller  $\rho^2 + 2\rho - 3 = 0$  vilket ger  $(\rho - 1)(\rho + 3) = 0$  och således är  $\rho = 1$ . Av detta följer att  $S$  är den del av konen för vilken  $1 \leq z \leq 3$  och  $x^2 + y^2 \leq 1$ . Sätt  $D : 0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \phi \leq 2\pi$ . Vi parametriserar  $S$  med Ortsvektorn  $\mathbf{r}(\rho, \phi) = (\rho \cos \phi, \rho \sin \phi, 3 - 2\rho)$  där  $(\rho, \phi) \in D$ . Observera att  $\mathbf{r}'_\rho \times \mathbf{r}'_\phi = (2\rho \cos \phi, 2\rho \sin \phi, \rho)$ . Arean av  $S$  är

$$\begin{aligned} A &= \iint_S dS \\ &= \iint_D |\mathbf{r}'_\rho \times \mathbf{r}'_\phi| d\rho d\phi \\ &= \sqrt{5} \int_0^1 \left( \int_0^{2\pi} \rho d\phi \right) d\rho \\ &= \pi\sqrt{5}. \end{aligned}$$

2.) Enligt Stokes Sats har vi

$$\int_\Gamma \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \hat{n} dS$$

där  $S$  är den del av planet  $x + y + z = 3$  som avgränsas av  $\Gamma$  (och är innanför cylindern  $x^2 + y^2 = 9$ ) och  $\hat{n}$  är en enhetsnormal till  $S$ .  $\Gamma$  genomlöps moturs sett från  $(0, 0, 51)$  och  $\hat{n}$  måste då ha positiv  $z$ -komponent så att  $S$  ligger till vänster om den riktning i vilken  $\Gamma$  genomlöps. Vi parametriserar  $S$  med hjälp av Ortsvektorn  $\mathbf{r}(x, y) = (x, y, 3 - x - y)$  med  $(x, y) \in D$  där  $D : x^2 + y^2 \leq 9$ . Vi har  $\mathbf{r}'_x \times \mathbf{r}'_y = (1, 1, 1)$  och  $\nabla \times \mathbf{A} = (0, -2y, 2z) = (0, -2y, 6 - 2x - 2y)$  på  $S$ . Nu får vi

$$\begin{aligned} \int_\Gamma \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \hat{n} dS \\ &= \iint_D (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot (\mathbf{r}'_x \times \mathbf{r}'_y) dx dy \\ &= \iint_D (0, -2y, 6 - 2x - 2y) \cdot (1, 1, 1) dx dy \\ &= \iint_D (6 - 2x - 4y) dx dy \\ &= [x = \rho \cos \phi, y = \rho \sin \phi, 0 \leq \rho \leq 3, 0 \leq \phi \leq 2\pi] \\ &= \int_0^3 \left( \int_0^{2\pi} [6 - 2\rho \cos \phi - 4\rho \sin \phi] d\phi \right) \rho d\rho \\ &= 54\pi. \end{aligned}$$

3.) Låt  $V$  vara den kropp som avgränsas av ytan  $S : x^2 + y^2 + z^2 = 1, x, y, z \geq 0$  och sidoytorna  $S_1 : x^2 + y^2 = 1, x, y \geq 0, z = 0, S_2 : y^2 + z^2 = 1, y, z \geq 0, x = 0, S_3 : x^2 + z^2 = 1, x, z \geq 0, y = 0$ . Vi söker flödet  $\Phi = \iint_S \mathbf{A} \cdot \hat{n} dS$  där  $\hat{n}$  pekar ut från  $V$  (ty då är  $\hat{n} \cdot \hat{z} \geq 0$ ). Enligt Gauss Sats har vi

$$\iint_{S+S_1+S_2+S_3} \mathbf{A} \cdot \hat{n} dS = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{A} dV$$

för flödet av  $\mathbf{A}$  ut ur  $V$ . På  $S_1$  är  $\hat{n} = (0, 0, -1)$  medan  $\mathbf{A} = (xy^2, 0, 0)$  och då är  $\mathbf{A} \cdot \hat{n} = 0$  på  $S_1$ . På  $S_2$  är  $\hat{n} = (-1, 0, 0)$  medan  $\mathbf{A} = (0, yz^2, 0)$  och då är  $\mathbf{A} \cdot \hat{n} = 0$  på  $S_2$ . På  $S_3$  är  $\hat{n} = (0, -1, 0)$  medan  $\mathbf{A} = (0, 0, x^2z)$  och då är  $\mathbf{A} \cdot \hat{n} = 0$  på  $S_3$ . Av detta följer att  $\iint_{S_1+S_2+S_3} \mathbf{A} \cdot \hat{n} dS = 0$  och vi får då att flödet är

$$\begin{aligned} \Phi &= \iint_S \mathbf{A} \cdot \hat{n} dS = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{A} dV \\ &= \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz \\ &= [x = r \cos \phi \sin \theta, y = r \sin \phi \sin \theta, z = r \cos \theta, \quad 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \pi/2, 0 \leq \phi \leq \pi/2] \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^1 r^4 dr \\ &= \frac{\pi}{10}. \end{aligned}$$

4.)  $\mathbf{A}$  är ett potentialfält om det finns en funktion  $\Phi$  med  $\mathbf{A} = \nabla\Phi$ . I sfäriska polära koordinater får vi då att

$$\mathbf{A} = \frac{\partial\Phi}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial\Phi}{\partial\theta} \hat{\theta} + \frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial\Phi}{\partial\phi} \hat{\phi}$$

av vilket vi erhåller ekvationssystemet

$$\Phi'_r = \frac{(1-r^2) \cos\phi \sin\theta}{(1+r^2)^2}, \quad \Phi'_\theta = \frac{r \cos\phi \cos\theta}{1+r^2}, \quad \Phi'_\phi = -\frac{r \sin\phi \sin\theta}{1+r^2}.$$

Integrering av den tredje ekvationen ger

$$\Phi(r, \theta, \phi) = \frac{r \cos\phi \sin\theta}{1+r^2} + g(r, \theta).$$

Insättning av detta i den andra ekvationen ger  $g'_\theta = 0$  vilket ger

$$\Phi(r, \theta, \phi) = \frac{r \cos\phi \sin\theta}{1+r^2} + g(r).$$

Insättning av detta uttryck i den första ekvationen ger  $g'(r) = 0$  och vi erhåller då

$$\Phi(r, \theta, \phi) = \frac{r \cos\phi \sin\theta}{1+r^2} + C$$

där  $C$  är en godtycklig konstant.

Kurvan  $\Gamma$  är skärningen mellan planet  $x = y$  och ytan  $x^2 + 4y^2 + 5z^2 = 25$  med  $x, y, z \geq 0$ . Då är  $x^2 + z^2 = 5$  (insättning av  $x = y$  i  $x^2 + 4y^2 + 5z^2 = 25$ ) och vi ser att denna kurva skär  $xy$ -planet i  $(\sqrt{5}, \sqrt{5}, 0)$  och  $z$ -axeln i  $(0, 0, \sqrt{5})$ . Eftersom  $\Gamma$  genomlöps moturs sett från  $(-1, -2, 0)$  då är  $(\sqrt{5}, \sqrt{5}, 0)$  startpunkten och  $(0, 0, \sqrt{5})$  är ändpunkten. I sfäriska koordinater har vi då  $(r, \theta, \phi) = (\sqrt{10}, \pi/2, \pi/4)$  som startpunkten och  $(r, \theta, \phi) = (\sqrt{5}, 0, \pi/4)$  som ändpunkt. Vi har

$$\int_{\Gamma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \Phi(\sqrt{5}, 0, \pi/4) - \Phi(\sqrt{10}, \pi/2, \pi/4) = -\frac{\sqrt{5}}{11}.$$

**5.) Lösning 1:** Kurvintegralen kan skrivas som  $\int_{\Gamma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}$  med  $\mathbf{A} = \left( \frac{x}{(x^2 + 4y^2)^{3/2}}, \frac{4y}{(x^2 + 4y^2)^{3/2}} \right)$ . Observera att  $\mathbf{A}$  är ett potentialfält i det område där  $(x, y) \neq (0, 0)$  eftersom

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{4y}{(x^2 + 4y^2)^{3/2}} = \frac{\partial}{\partial y} \frac{x}{(x^2 + 4y^2)^{3/2}}$$

i alla punkter där  $(x, y) \neq (0, 0)$ . Då är  $\mathbf{A} = \nabla\Phi$  med

$$\Phi = -\frac{1}{(x^2 + 4y^2)^{1/2}}$$

i varje enkelt sammanhängande område som utesluter origo  $(0, 0)$ . Ett sådant område är området  $1/2 \leq x + y \leq 3/2$  som innehåller linjen  $x + y = 1$ , och vi erhåller

$$\int_{\Gamma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \Phi(0, 1) - \Phi(1, 0) = \frac{1}{2}.$$

**Lösning 2:** Lägg till kurvorna  $\Gamma_1 : 1 \leq x \leq 2, y = 0$  och  $\Gamma_2 : x^2 + 4y^2 = 4, x, y \geq 0$ . Då är  $\Gamma_1 + \Gamma_2 + \Gamma$  en enkel, sluten styckvis  $C^1$ -kurva som omsluter det enkelt sammanhängande området  $D : x + y \geq 1, x^2 + 4y^2 \leq 4, x, y \geq 0$ . Enligt Greens formel gäller

$$\int_{\Gamma_1 + \Gamma_2 + \Gamma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D \left( \frac{\partial}{\partial x} \frac{4y}{(x^2 + 4y^2)^{3/2}} - \frac{\partial}{\partial y} \frac{x}{(x^2 + 4y^2)^{3/2}} \right) dx dy = 0$$

då  $\Gamma_1 + \Gamma_2 + \Gamma$  genomlöps moturs (och då genomlöps  $\Gamma$  från  $(0, 1)$  till  $(1, 0)$ ). Av detta följer att

$$\int_{\Gamma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\Gamma_1} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} + \int_{\Gamma_2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}$$

där  $\Gamma$  genomlöps nu från  $(1, 0)$  till  $(0, 1)$  och  $\Gamma_1$  och  $\Gamma_2$  genomlöps moturs.

Vi har

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma_1} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{\Gamma_1} \frac{x}{(x^2 + 4y^2)^{3/2}} dx + \frac{4y}{(x^2 + 4y^2)^{3/2}} dy \\ &= [1 \leq x \leq 2, y = 0] \\ &= \int_1^2 \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

och

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma_2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{\Gamma} \frac{x}{(x^2 + 4y^2)^{3/2}} dx + \frac{4y}{(x^2 + 4y^2)^{3/2}} dy \\ &= [x = 2 \cos \phi, y = \sin \phi, 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}] \\ &= 0 \end{aligned}$$

av vilket det följer att

$$\int_{\Gamma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \frac{1}{2}.$$

**Anmärkning:** Här finns det många varianter. En annan möjlighet är att lägga till två sträckor  $\Gamma_1 : x = 1, 0 \leq y \leq 1$  och  $\Gamma_2 : y = 1, 0 \leq x \leq 1$ . För att tillämpa Greens formel ska man genomlöpa  $\Gamma + \Gamma_1 + \Gamma_2$  moturs, och då är den sökta kurvintegralen lika med kurvintegralen

längs  $\Gamma_1 + \Gamma_2$  (moturs). Under **inga omständigheter** ska man ta sträckor som har origo som ändpunkt, för då är de integraler som uppstår divergenta.

**Lösning 3:** En direkt parametrisering av sträckan ger Ortsvektorn för punkter på  $\Gamma$  som  $\mathbf{r}(y) = (1 - y, y)$  med  $y : 0 \rightarrow 1$ . Då är kurvintegralen

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} &= \int_0^1 \mathbf{A}(\mathbf{r}(y)) \cdot \mathbf{r}'(y) dy \\ &= \int_0^1 \left( \frac{1-y}{(5y^2-2y+1)^{3/2}}, \frac{4y}{(5y^2-2y+1)^{3/2}} \right) \cdot (-1, 1) dy \\ &= \int_0^1 \frac{5y-1}{(5y^2-2y+1)^{3/2}} dy \\ &= [u = 5y^2 - 2y + 1, du = (10y - 2)dy] \\ &= \frac{1}{2} \int_1^4 \frac{du}{u^{3/2}} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

6.) Vektorfältet  $\mathbf{A}$  är singulärt på  $x$ -axeln. Låt  $S_\epsilon$  beteckna ytan  $x = y^2 + z^2$ ,  $0 < \epsilon^2 \leq x \leq 1$ , och låt  $S$  vara den givna ytan  $x = y^2 + z^2$ ,  $0 \leq x \leq 1$ . Vi har då det sökta flödet  $\Phi$  som

$$\Phi = \iint_S \mathbf{A} \cdot \hat{n} dS = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \iint_{S_\epsilon} \mathbf{A} \cdot \hat{n}_\epsilon dS_\epsilon.$$

Parametrisera  $S_\epsilon$  med Ortsvektorn  $\mathbf{r}(\rho, \phi) = (\rho^2, \rho \cos \phi, \rho \sin \phi)$  där  $(\rho, \phi) \in D$  med  $D : \epsilon \leq \rho \leq 1$ ,  $0 \leq \phi \leq 2\pi$ . Vi har  $\mathbf{r}'_\rho \times \mathbf{r}'_\phi = (\rho, -2\rho^2 \cos \phi, -2\rho^2 \sin \phi)$ . Vi ska ha  $\hat{n} \cdot \hat{x} \leq 0$  och då måste vi välja  $\hat{n}_\epsilon = -(\mathbf{r}'_\rho \times \mathbf{r}'_\phi) / \|\mathbf{r}'_\rho \times \mathbf{r}'_\phi\|$  av vilket det nu följer att har vi

$$\begin{aligned} \iint_{S_\epsilon} \mathbf{A} \cdot \hat{n}_\epsilon dS_\epsilon &= - \iint_D \mathbf{A} \cdot (\mathbf{r}'_\rho \times \mathbf{r}'_\phi) d\rho d\phi \\ &= \iint_D \left( \frac{1}{\rho}, \frac{\cos \phi}{\rho^2}, \frac{\sin \phi}{\rho^2} \right) \cdot (-\rho, 2\rho^2 \cos \phi, 2\rho^2 \sin \phi) d\rho d\phi \\ &= \iint_D d\rho d\phi \\ &= 2\pi(1 - \epsilon). \end{aligned}$$

Slutligen erhåller vi

$$\Phi = \iint_S \mathbf{A} \cdot \hat{n} dS = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \iint_{S_\epsilon} \mathbf{A} \cdot \hat{n}_\epsilon dS_\epsilon = 2\pi.$$