

**Tentamen i TATA69 Flervariabelanalys**  
**2016-10-22 kl 14–19**

Inga hjälpmedel tillåtna (inte heller miniräknare). 8/11/14 poäng med minst 3/4/5 uppgifter med minst 2 poäng (av 3 möjliga) ger betyg 3/4/5. Länk till lösningsskiss finns efter tentamen på kursens hemsida.

1. Bestäm alla lokala maximi- och minimipunkter för

$$f(x, y, z) = x^4 + y^3 + z^2 + 2x^2 + 6yz.$$

2. (a) Ange  $z'_x(x, y)$  och  $z'_y(x, y)$  ifall

$$z(x, y) = g(x^2 + e^y), \quad g \in C^1(\mathbf{R}). \quad (1p)$$

- (b) Bestäm alla  $C^1$ -funktioner  $z(x, y)$  som uppfyller

$$e^y z'_x(x, y) - 2x z'_y(x, y) = e^{2y} \quad \text{och} \quad z(0, y) = y.$$

$$(\text{T.ex. med hjälp av variabelbytet } u = x, v = x^2 + e^y.) \quad (2p)$$

3. Beräkna

$$\iint_D \frac{dx dy}{81 + (2x - y)^2},$$

där  $D$  är triangeln med hörn i  $(0, 0)$ ,  $(1, 2)$  och  $(4, -1)$ .

4. Låt

$$f(x, y) = x^3 - 3x^2y^5 + y.$$

Vilka av  $f$ 's nivåkurvor tangerar linjen  $y = 1$ ?

5. Beräkna

$$\iiint_D x^2 dx dy dz,$$

där  $D$  är den mängd i  $\mathbf{R}^3$  som ges av olikheterna

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, \quad x \leq 0, \quad x + \sqrt{3}y \leq 0, \quad z \geq \sqrt{x^2 + y^2}.$$

6. Visa att ekvationen

$$x^y = x + y - 3$$

definierar en  $C^1$ -funktion  $y(x)$  i en omgivning av punkten  $(x, y) = (1, 3)$ , och beräkna Taylorutvecklingen av ordning 2 för  $y(x)$  kring  $x = 1$ . Hur ser man att funktionen faktiskt blir av klass  $C^3$ , så att den kan Taylorutvecklas så långt?

## Lösningsskisser till TATA69 Flervariabelanalys 2016-10-22

1. Stationära punkter ges av  $\nabla f = (4x^3 + 4x, 3y^2 + 6z, 2z + 6y) = (0, 0, 0)$ , dvs.  $(x, y, z) = (0, 0, 0)$  eller  $(x, y, z) = (0, 6, -18)$ . Ur andraderivatorna fås de kvadratiske formerna

$$Q_{(0,0,0)}(h, k, l) = 4h^2 + 2l^2 + 12kl = 4h^2 + 2(l + 3k)^2 - 18k^2$$

och

$$Q_{(0,6,-18)}(h, k, l) = 4h^2 + 36k^2 + 2l^2 + 12kl = 4h^2 + 2(l + 3k)^2 + 18k^2.$$

Man visar med standardresonemang att den första är **indefinit** (t.ex. är  $Q_{(0,0,0)}(1, 0, 0) = 4 + 0 - 0 > 0$  och  $Q_{(0,0,0)}(0, 1, -3) = 0 + 0 - 18 < 0$ ) och den andra är **positivt definit** (det är uppenbart att  $Q_{(0,6,-18)} \geq 0$  överallt, och *enda* sättet att få  $Q_{(0,6,-18)}(h, k, l) = 0$  är att ta  $h = 0$ ,  $l + 3k = 0$  och  $k = 0$ , dvs.  $(h, k, l) = (0, 0, 0)$ ). Av detta följer (enligt sats) att  $(0, 0, 0)$  inte är någon lokal extrempunkt, medan  $(0, 6, -18)$  är en lokal minimipunkt.

**Svar:**  $f$  har lokalt minimum i  $(0, 6, -18)$ .

2. (a) Använd kedjeregeln.

**Svar:**  $z'_x(x, y) = g'(x^2 + e^y) \cdot 2x$  och  $z'_y(x, y) = g'(x^2 + e^y) \cdot e^y$ .

(Observera att  $g$  är en funktion av *en* variabel, så dess derivata ska betecknas med  $g'$ , precis som i envariabelanalyskursen. Det är *inte* korrekt att skriva partiella derivator  $g'_x$  och  $g'_y$  här. De partiella derivatorna står bara på  $z(x, y)$ , som ju är en funktion av *två* variabler;  $z(x, y)$  är sammansättningen av envariabelfunktionen  $g(t)$  och flervariabelfunktionen  $t = h(x, y) = x^2 + e^y$ .)

- (b) Med det föreslagna variabelbytet  $u = x$ ,  $v = x^2 + e^y$  fås  $z'_x = z'_u + 2x z'_v$  och  $z'_y = e^y z'_v$ , vilket insatt i PDE:n ger  $e^y(z'_u + 2x z'_v) - 2x(e^y z'_v) = e^{2y}$ , alltså  $z'_u = e^y = v - u^2$ . Integration med avseende på  $u$  ger  $z(u, v) = uv - \frac{1}{3}u^3 + g(v)$ , där  $g$  är en godtycklig  $\mathcal{C}^1$ -funktion av en variabel, alltså  $z(x, y) = x(x^2 + e^y) - \frac{1}{3}x^3 + g(x^2 + e^y) = \frac{2}{3}x^3 + xe^y + g(x^2 + e^y)$ . Bivillkoret ger till sist  $z(0, y) = g(e^y) = y$ , alltså  $g(t) = \ln(t)$ , för  $t > 0$ . (Att funktionen  $g(t)$  bara blir bestämd för  $t > 0$  har ingen betydelse för det slutliga svaret, eftersom enbart positiva värden  $t = e^y + x^2 > 0$  stoppas in i  $g(t)$  där.)

**Svar:**  $z(x, y) = \frac{2}{3}x^3 + xe^y + \ln(e^y + x^2)$ .

Anmärkning: Notera att liksom för linjära *ordinära* differentialekvationer (som ni har sett i envariabelanalysen) så har lösningen strukturen

”partikulärlösning plus homogenlösning”:  $z_p(x, y) = \frac{2}{3}x^3 + xe^y$  ger högerledet  $e^y$  vid insättning i PDE:n, medan  $z_h(x, y) = g(x^2 + e^y)$  löser den motsvarande homogena ekvationen  $e^y z'_x(x, y) - 2x z'_y(x, y) = 0$  (alltså med noll i högerledet).

Om man vill kontrollera att det verkligen är så (genom insättning) så behöver man resultatet från (a)-uppgiften. Prova det, så märker du varför det är viktigt att det verkligen står *samma* uttryck  $g'(x^2 + e^y)$  på båda ställena, och inte  $g'_x$  resp.  $g'_y$ . Annars kommer ju inte de två termerna att ta ut varandra!

3. Man kan t.ex. göra det linjära variabelbytet  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = u \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + v \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ , dvs.  $x = u + 4v$ ,  $y = 2u - v$ . Detta ger en ny triangel  $E$  i  $uv$ -planet, med hörn i  $(0, 0)$ ,  $(1, 0)$  och  $(0, 1)$ . Determinanten  $\frac{d(x,y)}{d(u,v)} = \det \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = -9$  ger  $dxdy = |-9| dudv$ , och alltså

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{dxdy}{81 + (2x - y)^2} &= \iint_E \frac{9 dudv}{81 + (9v)^2} = \frac{1}{9} \int_{v=0}^1 \left( \int_{u=0}^{1-v} \frac{du}{1 + v^2} \right) dv \\ &= \frac{1}{9} \int_0^1 \frac{1 - v}{1 + v^2} dv = \frac{1}{9} \left[ \arctan v - \frac{1}{2} \ln(1 + v^2) \right]_0^1 = \frac{1}{9} \left( \frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2} \right). \end{aligned}$$

**Svar:** Se ovan.

(Notera att svaret måste bli positivt eftersom vi integrerar den överallt positiva funktionen  $f(x, y) = 1/(81 + (2x - y)^2)$ , och man kan se att det blev positivt eftersom  $\pi = 3,14\dots > 3$  och  $\ln 2 = 0,69\dots < \ln e = 1$ , så att  $\pi/4 > 3/4 > 1/2 > (\ln 2)/2$ .)

4. Som bekant är gradienten  $\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 3x^2 - 6xy^5 \\ -15x^2y^4 + 1 \end{pmatrix}$  vinkelrät mot nivåkurvan genom punkten  $(x, y)$ . I en punkt  $(x, y) = (a, 1)$  på linjen  $y = 1$  måste därmed gradienten vara riktad i  $y$ -led för att nivåkurvan ska tangera linjen, alltså


$$\nabla f(a, 1) = \begin{pmatrix} 3a^2 - 6a \\ -15a^2 + 1 \end{pmatrix} \parallel \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

vilket är fallet om och endast om  $3a^2 - 6a = 0$ . Detta ger  $a = 0$  eller  $a = 2$ , så nivåkurvorna genom  $(0, 1)$  och  $(2, 1)$  tangerar linjen. Insättning av dessa punkter i formeln för  $f(x, y)$  ger  $f(0, 1) = 1$  och  $f(2, 1) = -3$ .

**Svar:** Nivåkurvorna  $f(x, y) = 1$  och  $f(x, y) = -3$ .


(Om man ska vara noggrann bör man även påpeka att  $\nabla f(0, 1)$  och  $\nabla f(2, 1)$  inte är nollvektorn, eftersom  $-15a^2 + 1 \neq 0$  då  $a = 0$  eller  $a = 2$ . Detta villkor garanterar ju, via implicita funktionsatsen, att nivåmängden verkligen är en *kurva* i närheten av respektive punkt.)

5. Villkoren  $x \leq 0$  och  $x + \sqrt{3}y \leq 0$  representerar en sektor i rummet som avgränsas av planen  $x = 0$  och  $x + \sqrt{3}y = 0$ . Vi kan illustrera detta i en figur sedd uppifrån (där "uppåt" betyder positiv  $z$ -led):



Det grå området indikerar  $x \leq 0$ , det blå området indikerar  $x + \sqrt{3}y \leq 0$  (alltså  $y \leq -x/\sqrt{3}$ ), och deras skärning ger sektorn nere till vänster mellan de tjocka svarta strecken (som bildar vinklarna  $5\pi/6$  respektive  $3\pi/2$  med den positiva  $x$ -axeln).

Olikheten  $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$  är området ovanför konen  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ , vilket enklast illustreras i en figur sedd från sidan. Den verkliga mängden i tre dimensioner fås genom att rotera figurens grå område runt  $z$ -axeln. Vinkeln mellan positiva  $z$ -axeln och det tjocka strecket är  $\pi/4$ .



Olikheten  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ , slutligen, definierar såklart ett klot med centrum i origo och radie 2.

Vid övergång till rympolära koordinater fås därmed ett nytt område  $E$

som ges av  $0 \leq r \leq 2$ ,  $5\pi/6 \leq \varphi \leq 3\pi/2$  och  $0 \leq \theta \leq \pi/4$ , alltså

$$\begin{aligned} \iiint_D x^2 dx dy dz &= \iiint_E (r \cos \varphi \sin \theta)^2 \cdot r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \\ &= \left( \int_0^2 r^4 dr \right) \left( \int_0^{\pi/4} \sin^3 \theta d\theta \right) \left( \int_{5\pi/6}^{3\pi/2} \cos^2 \varphi d\varphi \right) \\ &= \left( \int_0^2 r^4 dr \right) \left( \int_0^{\pi/4} (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta d\theta \right) \left( \int_{5\pi/6}^{3\pi/2} \frac{1 + \cos 2\varphi}{2} d\varphi \right) \\ &= \left[ \frac{r^5}{5} \right]_0^2 \left[ -\cos \theta + \frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^{\pi/4} \left[ \frac{\varphi}{2} + \frac{\sin 2\varphi}{4} \right]_{5\pi/6}^{3\pi/2} \\ &= \frac{32}{5} \left( \frac{2}{3} - \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left( \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{8} \right). \end{aligned}$$

**Svar:**  $\frac{(8 - 5\sqrt{2})(8\pi + 3\sqrt{3})}{45}$ .

(Svaret måste uppenbart bli positivt eftersom vi integrerar  $f(x, y, z) = x^2 \geq 0$ , och man kan se att det blev positivt eftersom  $\sqrt{2} = 1,41\dots < 1,6 = 8/5$ , eller, om man föredrar det,  $8 = \sqrt{64} > \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ .)


**En alternativ lösning** är att använda stavar i  $z$ -led, med konen som ”botten” och sfären som ”lock”, alltså

$$\iiint_D x^2 dx dy dz = \iint_{\tilde{D}} \left( \int_{z=\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{4-(x^2+y^2)}} x^2 dz \right) dx dy,$$

där projektionen av  $D$  på  $xy$ -planet är

$$\begin{aligned} \tilde{D} &= \left\{ (x, y) \in \mathbf{R}^2 : x \leq 0, x + \sqrt{3}y \leq 0, \sqrt{x^2 + y^2} \leq \sqrt{4 - (x^2 + y^2)} \right\} \\ &= \left\{ (x, y) \in \mathbf{R}^2 : x \leq 0, x + \sqrt{3}y \leq 0, x^2 + y^2 \leq 2 \right\}. \end{aligned}$$

Det blir alltså en cirkelsektor i  $xy$ -planet, med radien  $\sqrt{2}$ . Observera att detta *inte* är lika med *klotets* radie 2; se figuren, där cirkelradien ifråga representeras av det blå strecket:



Dubbelintegralen över  $\tilde{D}$  beräknas enklast i planpolära koordinater, med nytt område  $F = \{(\rho, \varphi) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq \rho \leq \sqrt{2}, 5\pi/6 \leq \varphi \leq 3\pi/2\}$ :

$$\begin{aligned} & \iint_{\tilde{D}} x^2 (\sqrt{4 - (x^2 + y^2)} - \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy \\ &= \iint_F (\rho \cos \varphi)^2 (\sqrt{4 - \rho^2} - \rho) \rho d\rho d\varphi \\ &= \left( \int_{5\pi/6}^{3\pi/2} \cos^2 \varphi d\varphi \right) \left( \int_{\rho=0}^{\sqrt{2}} \rho^3 \sqrt{4 - \rho^2} d\rho - \int_{\rho=0}^{\sqrt{2}} \rho^4 d\rho \right). \end{aligned}$$

Med  $t = 4 - \rho^2$  (och  $dt = -2\rho d\rho$ ) får man att den första  $\rho$ -integralen är

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2} \int_0^{\sqrt{2}} \rho^2 \sqrt{4 - \rho^2} (-2\rho) d\rho &= -\frac{1}{2} \int_4^2 (4-t) \sqrt{t} dt = \frac{1}{2} \left[ \frac{4t^{3/2}}{3/2} - \frac{t^{5/2}}{5/2} \right]_2^4 \\ &= \frac{4}{3} (4^{3/2} - 2^{3/2}) - \frac{1}{5} (4^{5/2} - 2^{5/2}) = \frac{64 - 28\sqrt{2}}{15}, \end{aligned}$$

från vilket man subtraherar  $[\frac{1}{5}\rho^5]_0^{\sqrt{2}} = \frac{12}{15}\sqrt{2}$ , och multiplicerar med  $\varphi$ -integralen som blir  $\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{8}$  precis som i den första lösningen.

**Ännu en alternativ lösning** är att använda skivor (tvärsnitt för fixt  $z$ ). Då måste man dela upp kroppen i två delar, en undre del med  $0 \leq z \leq \sqrt{2}$ , och en övre del med  $\sqrt{2} \leq z \leq 2$  (se figuren ovan), men å andra sidan blir primitivuträkningarna ganska bekväma. För varje fixt  $z$  är tvärsnittet  $D_z$  en cirkelsektor med samma vinklar  $5\pi/6 \leq \varphi \leq 3\pi/2$  som ovan, men med en  $z$ -beroende radie; i den undre delen har vi  $0 \leq \rho \leq z$  (radien ges av konen  $z = \rho$ ) och i den övre delen är  $0 \leq \rho \leq \sqrt{4 - z^2}$  (radien ges av sfären  $\rho^2 + z^2 = 4$ ). Detta ger (om

$E_z$  betecknar den just beskrivna  $z$ -beroende rektangeln i  $\rho\varphi$ -planet som motsvarar cirkelsektorn  $D_z$  i  $xy$ -planet) att

$$\begin{aligned}
\iiint_D x^2 dx dy dz &= \int_{z=0}^2 \left( \iint_{D_z} x^2 dx dy \right) dz \\
&= \int_{z=0}^2 \left( \iint_{E_z} (\rho \cos \varphi)^2 \rho d\rho d\varphi \right) dz \\
&= \int_{z=0}^{\sqrt{2}} \left( \int_{5\pi/6}^{3\pi/2} \cos^2 \varphi d\varphi \right) \left( \int_0^z \rho^3 d\rho \right) dz \\
&\quad + \int_{z=\sqrt{2}}^2 \left( \int_{5\pi/6}^{3\pi/2} \cos^2 \varphi d\varphi \right) \left( \int_0^{\sqrt{4-z^2}} \rho^3 d\rho \right) dz \\
&= \left( \int_{5\pi/6}^{3\pi/2} \cos^2 \varphi d\varphi \right) \left( \int_{z=0}^{\sqrt{2}} \frac{z^4}{4} dz + \int_{z=\sqrt{2}}^2 \frac{(4-z^2)^2}{4} dz \right) \\
&= \left( \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{8} \right) \cdot \frac{1}{4} \left( \left[ \frac{z^5}{5} \right]_0^{\sqrt{2}} + \left[ 16z - \frac{8z^3}{3} + \frac{z^5}{5} \right]_{\sqrt{2}}^2 \right),
\end{aligned}$$

vilket (såklart) ger samma svar ännu en gång.

6. Sätt  $F(x, y) = x^y - x - y$ . Då är  $F'_y(x, y) = x^y \ln x - 1$ . Eftersom  $F$  är av klass  $\mathcal{C}^1$ ,  $F(1, 3) = -3$  och  $F'_y(1, 3) = -1 \neq 0$  så är villkoren för implicita funktionssatsen uppfyllda, och den säger då att ekvationen  $F(x, y) = -3$  implicit definierar en  $\mathcal{C}^1$ -funktion  $y(x)$  nära  $(x, y) = (1, 3)$ , vilket skulle visas. Notera att  $y(1) = 3$  per definition.

Implicit derivering av sambandet  $x^{y(x)} - x - y(x) = -3$  ger

$$x^{y(x)} \left( y'(x) \ln x + y(x)/x \right) - 1 - y'(x) = 0.$$

(När man deriverar  $x^{y(x)}$  får man tänka på att det betyder  $e^{y(x) \ln x}$ .) Om vi löser ut  $y'(x)$  får vi

$$y'(x) = \frac{1 - y(x)x^{y(x)-1}}{x^{y(x)} \ln x - 1}.$$

Här är uttrycket i högerledet av klass  $\mathcal{C}^1$  (nära  $x = 1$ ), eftersom vi vet att  $y(x)$  är det, och eftersom vi inte dividerar med noll. Alltså är även vänsterledet  $y'(x)$  av klass  $\mathcal{C}^1$ , vilket betyder att funktionen  $y(x)$  själv är av klass  $\mathcal{C}^2$ .

Vi övergår nu till att skriva  $y$  och  $y'$  istället för  $y(x)$  och  $y'(x)$ , för

enkelhets skull. Derivering av  $y' \cdot (x^y \ln x - 1) = 1 - yx^{y-1}$  ger

$$\begin{aligned} y'' \cdot (x^y \ln x - 1) + y' \cdot (x^y(y' \ln x + y/x) \ln x + x^y/x) \\ = -y' \cdot x^{y-1} - y \cdot x^{y-1}(y' \ln x + (y-1)/x). \end{aligned}$$

Om vi här löser ut  $y''(x)$  får vi igen ett uttryck av klass  $\mathcal{C}^1$ , vilket betyder att  $y(x)$  själv är av klass  $\mathcal{C}^3$ . (Man kan fortsätta på liknande sätt och visa att  $y(x)$  rentav är av klass  $\mathcal{C}^\infty$ .)

Insättning av  $x = 1$  och  $y(1) = 3$  i formeln för  $y'(x)$  ger  $y'(1) = (-2)/(-1) = 2$ , och insättning av detta i formeln för  $y''(x)$  ger  $-y''(1) + 2 \cdot 1 = -2 - 3 \cdot 2$ , alltså  $y''(1) = 10$ . Taylors formel ger nu utvecklingen av ordning 2 kring  $x = 1$ :

$$\begin{aligned} y(1+h) &= y(1) + y'(1)h + \frac{y''(1)h^2}{2!} + \mathcal{O}(h^3) \\ &= 3 + 2h + 5h^2 + \mathcal{O}(h^3). \end{aligned}$$

**Svar:** Se ovan.

**En arbetsbesparande variant** är att notera att ekvationen  $x^y = x + y - 3$  är ekvivalent med  $y \ln x = \ln(x + y - 3)$  (åtminstone för  $x > 0$  och  $x + y - 3 > 0$ , och det kan vi ju anta gäller eftersom vi bara är intresserade av vad som händer nära  $(x, y) = (1, 3)$ ). Man kan alltså skriva ekvationen som  $G(x, y) = 0$ , där  $G(x, y) = y \ln x - \ln(x + y - 3)$ . Sedan beräknar man  $G'_y(x, y) = \ln x - (x + y - 3)^{-1}$ , kontrollerar att  $G'_y(1, 3) \neq 0$ , deriverar implicit, osv., precis som ovan, fast med mycket enklare uträkningar!