

## Tentamen i TATA69 Flervariabelanalys

2018-01-04 kl. 8.00–13.00

Inga hjälpmedel tillåtna (inte heller miniräknare). 8/11/14 poäng med minst 3/4/5 uppgifter med minst 2 poäng (av 3 möjliga) ger betyg 3/4/5. Länk till lösningsskiss finns efter tentamen på kursens hemsida.

1. Bestäm alla lokala maximi- och minimipunkter för  $f(x, y) = x^2 + 4y^2 + 8xy - x^3$ .
2. Bestäm alla funktioner  $f(x, y, z)$  av klass  $\mathcal{C}^1$  som uppfyller

$$\nabla f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2xy^2e^y + yze^z \\ yx^2(y+2)e^y + (xz+1)e^z + 3 \\ y(xz+x+1)e^z + 2z \end{pmatrix}, \quad f(0, 1, 0) = 2.$$

3. Beräkna  $\iint_D \frac{x+2y}{3y-x} dx dy$ , där området  $D$  ges av  $2 \leq 3y-x \leq 6$  och  $2 \leq 2x-y \leq 4$ .
4. Bestäm alla linjer  $Ax + By = C$  som går genom punkten  $(-2, -4)$  och tangerar kurvan  $(x, y) = (t^2 + 1, t^2 - t)$ ,  $t \in \mathbf{R}$ .
5. Beräkna volymen av området

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : z \geq (x^2 + y^2)^{1/4}, 3x^2 + 3y^2 + z^2 \leq 4\}.$$

6. En parametriserad kurva  $(x(t), y(t))$  i  $xy$ -planet avbildas via sambanden

$$(u, v) = (x + y^3, x^3y^2)$$

på en kurva  $(u(t), v(t))$  i  $uv$ -planet. Om  $(x(0), y(0)) = (2, 1)$ , vad ska kurvans tangentvektor  $\begin{pmatrix} x'(0) \\ y'(0) \end{pmatrix}$  vara för att man i motsvarande punkt på kurvan i  $uv$ -planet ska få tangentvektorn  $\begin{pmatrix} u'(0) \\ v'(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ?

## Lösningsskisser till TATA69 Flervariabelanalys 2018-01-04

1. Stationära punkter fås ur ekvationerna  $f'_x = 2x + 8y - 3x^2 = 0$  och  $f'_y = 8y + 8x = 0$ , med lösningarna  $(x, y) = (0, 0)$  eller  $(x, y) = (-2, 2)$ . Andraderivatorna är  $f''_{xx} = 2 - 6x$ ,  $f''_{xy} = 8$  och  $f''_{yy} = 8$ , vilket ger de kvadratiske formerna

$$Q_{(0,0)}(h, k) = 2h^2 + 16hk + 8k^2 = 8(k + h)^2 - 6h^2$$

(indefinit, alltså är  $(0, 0)$  en sadelpunkt) och

$$Q_{(-2,2)}(h, k) = 14h^2 + 16hk + 8k^2 = 8(k + h)^2 + 6h^2$$

(positivt definit, alltså är  $(-2, 2)$  en lokal minimipunkt).

**Svar:** Funktionen har lokalt minimum i punkten  $(-2, 2)$ .

2. Från den första ekvationen  $f'_x = 2xy^2e^y + yze^z$  fås  $f(x, y, z) = x^2y^2e^y + xyze^z + g(y, z)$  för någon ännu okänd funktion  $g(y, z)$ . Insättning av detta i den andra ekvationen  $f'_y = yx^2(y + 2)e^y + (xz + 1)e^z + 3$  ger  $g'_y = e^z + 3$ , dvs.  $g(y, z) = y(e^z + 3) + h(z)$  för någon funktion  $h(z)$ . Insättning av det vi nu vet om  $f$  i den sista ekvationen  $f'_z = y(xz + x + 1)e^z + 2z$  ger  $h' = 2z$ , alltså  $h(z) = z^2 + C$  för någon konstant  $C$ . Alltså  $f(x, y, z) = x^2y^2e^y + xyze^z + y(e^z + 3) + z^2 + C$ , och villkoret  $f(0, 1, 0) = 2$  ger  $C = -2$ .

**Svar:**  $f(x, y, z) = x^2y^2e^y + xyze^z + y(e^z + 3) + z^2 - 2$ .

3. Variabelbytet  $u = 3y - x$ ,  $v = 2x - y$  ger direkt ett nytt område  $E$  med gränserna  $2 \leq u \leq 6$  och  $2 \leq v \leq 4$ . Funktionaldeterminanten  $\frac{d(u,v)}{d(x,y)} = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -5$  ger  $dudv = |-5| dx dy = 5 dx dy$ . Alltså

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{x + 2y}{3y - x} dx dy &= \iint_E \frac{u + v}{u} \frac{dudv}{5} = \frac{1}{5} \int_{u=2}^6 \left( \int_{v=2}^4 \left( 1 + \frac{v}{u} \right) dv \right) du \\ &= \frac{1}{5} \int_{u=2}^6 \left( 2 + \frac{6}{u} \right) du = \frac{1}{5} (8 + 6 \ln(6/2)). \end{aligned}$$

**Svar:**  $\frac{2}{5}(4 + 3 \ln 3)$ .

4. Vi söker en punkt  $P = (x(t), y(t))$  på kurvan sådan att vektorn från  $P$  till  $(-2, -4)$  är parallell med kurvans tangentvektor i  $P$ , alltså  $\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}$ . Detta ger

$$\begin{pmatrix} t^2 + 1 \\ t^2 - t \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix} \parallel \begin{pmatrix} 2t \\ 2t - 1 \end{pmatrix},$$

vilket är uppfyllt då

$$0 = \begin{vmatrix} t^2 + 3 & 2t \\ t^2 - t + 4 & 2t - 1 \end{vmatrix} = t^2 - 2t - 3 = (t + 1)(t - 3).$$

Insättning av värdena  $t = -1$  och  $t = 3$  ger punkterna  $(x, y) = (2, 2)$  respektive  $(10, 6)$ , och att räkna ut ekvationerna för de linjer som förbinder dessa punkter med  $(-2, -4)$  är en rutinsak.

**Svar:**  $3x - 2y = 2$  och  $5x - 6y = 14$ .

5.  $V$ :s volym är

$$\iiint_D dx dy dz = \iint_E \left( \int_{z=(x^2+y^2)^{1/4}}^{(4-3x^2-3y^2)^{1/2}} dz \right) dx dy$$

där  $E$  är det område i  $\mathbf{R}^2$  där olikheten

$$(x^2 + y^2)^{1/4} \leq (4 - 3x^2 - 3y^2)^{1/2}$$

gäller. I polära koordinater  $(\rho, \varphi)$  fås  $\sqrt{\rho} \leq \sqrt{4 - 3\rho^2}$ , alltså  $0 \leq \rho \leq 1$ , så  $E$  är helt enkelt enhetscirkelskivan. Integralen ovan blir alltså

$$\begin{aligned} 2\pi \int_0^1 \left( \sqrt{4 - 3\rho^2} - \sqrt{\rho} \right) \rho d\rho &= 2\pi \left[ -\frac{1}{9}(4 - 3\rho^2)^{3/2} - \frac{2}{5}\rho^{5/2} \right]_0^1 \\ &= 2\pi \left( \frac{4^{3/2} - 1}{9} - \frac{2}{5} \right) = 2\pi \left( \frac{7}{9} - \frac{2}{5} \right). \end{aligned}$$

**Svar:**  $34\pi/45$ .

6. Kurvan i  $uv$ -planet ges av

$$u(t) = x(t) + y(t)^3, \quad v(t) = x(t)^3 y(t)^2,$$

så med kedjeregeln fås

$$u'(t) = x'(t) + 3y(t)^2 y'(t), \quad v'(t) = 3x(t)^2 x'(t) \cdot y(t)^2 + x(t)^3 \cdot 2y(t)y'(t).$$

Insättning av  $t = 0$  och de givna värdena  $x(0) = 2$  och  $y(0) = 1$  ger

$$u'(0) = x'(0) + 3y'(0), \quad v'(0) = 12x'(0) + 16y'(0),$$

dvs.

$$\begin{pmatrix} u'(0) \\ v'(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 12 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'(0) \\ y'(0) \end{pmatrix}.$$

(Anmärkning: Matrisen här är helt enkelt avbildningens funktionalmatris i punkten  $(x, y) = (2, 1)$ .) För att få  $u'(0) = 1$  och  $v'(0) = 0$  måste vi ta

$$\begin{pmatrix} x'(0) \\ y'(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 12 & 16 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{-20} \begin{pmatrix} 16 & -3 \\ -12 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

**Svar:**  $x'(0) = -4/5$  och  $y'(0) = 3/5$ .